

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Posterisan žvakutės Standartizuota bakterijų kultūros suspensija

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.
- Jeigu Jūsų savijauta per 10 dienų nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Posterisan ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Posterisan
3. Kaip vartoti Posterisan
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Posterisan
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Posterisan ir kam jis vartojamas

Posterisan žvakutės tinka su hemorojumi susijusiems negalavimams išangės srityje: niežuliui, šlapiavimui ir deginimui malšinti.

Jeigu Jūsų savijauta per 10 dienų nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

2. Kas žinotina prieš vartojant Posterisan

Posterisan vartoti negalima:

- jeigu yra alergija veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Posterisan.

Jei yra grybelių sukeltas pažeidimas, papildomai būtina vartoti lokalaus poveikio preparatų nuo grybelių.

Kiti vaistai ir Posterisan

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju.

Duomenų, kad nėščioms moterims ar žindyvėms Posterisan vartoti draudžiama arba kad jis yra labai pavojingas, nėra.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Poveikio gebėjimui vairuoti transportą ir valdyti mechanizmus nepastebėta.

Posterisan sudėtyje yra makrogolglicerolio hidroksistearato, kuris gali sukelti odos reakcijų.

3. Kaip vartoti Posterisan

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra du kartus per dieną. Jei negalavimas stipresnis, kartais žvakučių galima vartoti ir dažniau. Žvakutes reikia vartoti iš ryto ir vakare, geriausia po tuštinimosi. Vartoti giliai į išangę po vieną žvakutę.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Posterisan žvakučių saugumas veiksmingumas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams neištirtas, todėl minėtiems pacientams jų reikia nevartoti.

Žvakutės išėmimas

Prieš vartojant žvakutę, reikia perplėšti ar perkirpti aliuminio foliją nuo viršūnės strėlės nurodyta kryptimi išilgai žvakutės tiek, kad būtų galima ją lengvai išimti.

Žinotina

Žvakutės ir tepalas, vartojamas išangės srityje, dėl kūno temperatūros gali sutepti skalbinius, todėl patariama naudoti minkštą įklotą, pvz., popierinę nosinę ar vatos tamponą.

Gydymo trukmė priklauso nuo ligos, jos sunkumo bei gijimo eigos. Posterisan žvakučių galima vartoti ilgesnį laiką. Preparatas retina ligos pasikartojimą, todėl išnykus niežuliui, šlapiavimui bei deginančiam skausmui, yra tikslinga dar kurį laiką toliau vartoti Posterisan žvakučių.

Rekomenduojamos gydymo trukmės reikia laikytis ir tokiu atveju, jeigu paciento savijauta pagerės anksčiau.

Jeigu manote, kad Posterisan veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Ką daryti pavartojus per didelę Posterisan dozę?

Tinkamai vartojamų žvakučių Posterisan perdozavimo ar apsinuodijimo atvejų nežinoma.

Pacientui (pvz., vaikui) nurijus didesnį kiekį žvakučių Posterisan, sunkaus apsinuodijimo tikriausiai nebūtų, tačiau negalavimų, pvz., pilvo skausmas, šleikštulys, atsirasti gali. Kadangi pavartojus žvakučių Posterisan vieną ar daugiau kartų dažniau, negu nurodyta, nepageidaujamas poveikis tikriausiai nesustiprės, vartojimą reikia sumažinti iki reikiamos dozės ir toliau vaistą dozuoti taip, kaip nurodyta.

Pamiršus pavartoti Posterisan

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Posterisan

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažni (nuo $\geq 1/100$ iki $<1/10$): lokali odos reakcija (pvz.: niežulys, deginimas).

Nedažni (nuo $\geq 1/1\ 000$ iki $<1/100$): alerginė odos reakcija (pvz.: dėl jautrumo konservantui fenoliui).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu

NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Posterisan

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Posterisan vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Posterisan sudėtis

- Veiklioji medžiaga yra standartizuota bakterijų kultūros suspensija. Kiekvienoje žvakutėje yra 387,1 mg standartizuotos bakterijų kultūros suspensijos, kurios sudėtyje yra 660×10^6 inaktyvuotų *Escherichia coli* bakterijų (ląstelių ir jų medžiagų apykaitos produktų).
- Pagalbinės medžiagos yra kietieji riebalai ir makrogolglicerolio hidroksistearatas, fenolis.

Posterisan išvaizda ir kiekis pakuotėje

Kartono dėžutėje yra 10 homogeniškų, rusvai gelsvos spalvos žvakučių, supakuotų į aliuminio/PE lizdines plokšteles.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2
12277 Berlin
Vokietija
Tel. 0 30/7 20 82-0, faksas 0 30/7 20 82-200.
El. paštas: info@kade.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

UAB Morfėjus
Žalgirio g. 93-42
LT-08218 Vilnius
Tel. + 370 5 2796328

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2013-11-14

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.